

ANTIBIOPROPHYLAXIE EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE

Acte chirurgical	Antibiotique DCI	Dose initiale	Ré-injection et durée
- Gastrostomie endoscopique - Sclérose de varices oesophagiennes - Dilatation endoscopique, prothèse digestive, Laser, coagulation au plasma argon	Amoxicilline-acide clavulanique**	2 g IV lente	Dose unique
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	900 mg IVSE 5 mg/kg	Dose unique Dose unique
- Ponction sous écho endoscopie transcolique	Amoxicilline-acide clavulanique** (à la demande du gastroentérologue)	2 g IV lente	Dose unique
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine (à la demande du gastroentérologue)	900 mg IVSE 5 mg/kg	Dose unique Dose unique
- Cholangio rétrograde (CPRE) - Sphinctérotomie	Céfotaxime (à la demande du gastroentérologue)	2 g IV lente	Dose unique (vérifier poursuite et durée des ATB en postopératoire)
	Allergie : Gentamicine (à la demande du gastroentérologue)	5 mg/kg	Dose unique (vérifier poursuite et durée des ATB en postopératoire)
- Coloscopie ou Fibroscopie (sans cirrhose) - Ligature de VO - Prothèse oesophagienne - Coloscopie ou Fibroscopie avec cirrhose - Ponction sous écho-endoscopie (sauf ponction trans-colorectale)	Pas d'ANTIBIOPROPHYLAXIE		
- Drainage biliaire pour obstruction cancéreuse ou bénigne, ou lithiase (prothèse biliaire par voie transhépatique)	Traitement curatif <i>Poursuite du traitement en cours</i> (vérifier poursuite et durée des ATB en postopératoire)		

** AUGMENTIN® : amoxicilline + acide clavulanique

Drs B. Szekeley et P. Lesprit le 21/03/2019

Validé en endoscopie digestive et par la COMAI et le CLIN le 21/03/2019

Service Anesthésie Pr Fischler