

ANTIBIOPROPHYLAXIE EN CHIRURGIE ORL,

Acte chirurgical	Antibiotique DCI	Dose initiale	Ré-injection et durée
OTOLOGIE : Chirurgie de l'étrier, de l'oreille propre : - tympanoplastie, - myringoplastie, - stapéctomie. <i>Si oreille inflammatoire, continuer l'antibiothérapie en cours.</i>	Pas d'ANTIBIOPROPHYLAXIE		
OTONEUROCHIRURGIE : chirurgie de la face, du cou et chirurgie endonasale avec temps neurochirurgical (crânialisation des sinus frontaux ...)	Céfazoline	2 g IV lente	Dose unique (si durée > 4 h, réinjecter 1g)
	Allergie : Vancomycine*	30 mg/kg IVSE en 120 min	Dose unique
RHINOLOGIE : Chirurgie avec méchage < 48h. - septoplastie - turbinectomie - méatotomie - Ethmoïdectomie - Rhinoplastie (sans implant)	Pas d'ANTIBIOPROPHYLAXIE		
- Rhinoplastie avec mise en place d'un greffon, reprise chirurgicale	Céfazoline	2 g IV lente	Dose unique
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	900 mg 5 mg/kg/j IVSE	Dose unique Dose unique

Chirurgie naso-sinusienne avec méchage >48h.	amoxicilline, acide clavulanique**	2 g IV lente	Ré-injection de 1g/2h en peropératoire puis 1 g toutes les 6h pendant 24h
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	900 mg 5 mg/kg/j IVSE	Ré-injection de 600 mg si durée> 4h puis 600 mg/6h pendant 24h Dose unique
CHIRURGIE DE LA CAVITE BUCCALE : - Amygdalectomie - Chirurgie vélo-pharyngée.	Pas d'ANTIBIOPROPHYLAXIE		
CHIRURGIE CERVICO-FACIALE : Chirurgie carcinologique ou chirurgie septique ou avec ouverture buccale, pharyngée ou laryngée : laryngectomie, BPTM, glossectomie, pelvectomie...	Amoxicilline, acide clavulanique**	2 g IV lente	Ré-injection de 1g/2h en peropératoire puis 1 g toutes les 6h pendant 24h
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	900 mg 5 mg/kg/j IVSE	Ré-injection de 600 mg si durée> 4h puis 600 mg/6h pendant 24h Dose unique
- Chirurgie alvéolaire - Extraction dentaire en milieu non septique	Prévention de l'endocardite (voir rubrique prophylaxie de l'endocardite)		
Chirurgie cervico-faciale propre (sans ouverture buccale): - thyroïdectomie, - Chirurgie des glandes salivaires(sans accès par la cavité bucco-pharyngée), parotidectomie, - Cervicotomie - curage ganglionnaire	Pas d'ANTIBIOPROPHYLAXIE		

- La présence d'un drainage n'est pas un argument pour prolonger la durée de l'antibioprophylaxie.