

	CONDUITE A TENIR CHOC ANAPHYLACTIQUE	<u>Réf</u> : SSPI <u>Version</u> : 02 <u>Date de création</u> : Novembre 2013 <u>Date d'application</u> : juin 2019 <u>Page 2 sur 2</u>

En cas de collapsus :

1mg d'adrénaline à renouveler jusqu'à normalisation de la tension avec relais IVSE possible
Voire réalisation d'un massage cardiaque en cas d'inefficacité circulatoire

En cas de bronchospasme :

Ventoline : 10 bouffées

Salbutamol IV : 0,25 et 1,5 mg/heure soit ½ à 3 ampoules en 10 heures. La dose sera adaptée toutes les 10 minutes en fonction de l'évolution clinique et de la tolérance du produit.

Prélèvement

Kit anaphylaxie histamine triptase IGE spécifique 1 tube rouge 7.5 ml 1 tube violet 7.5 ml

Premier prélèvement 30 min

Deuxième prélèvement 2 h

Tests cutanés à distance

Quand ? 4 à 6 semaines après la réaction

Où ? Centre diagnostique d'allergo-anesthésie

- Hôpital Tenon :

Fax des documents 'sfar' résumé des événements + bilan allergologique + coordonnées de patient au 01 56 01 72 34 . Ils prennent contact ensuite directement avec les patients.

- Hôpital Saint Joseph :

Remplir la fiche de liaison Foch/Saint Jo et prévenir l'Infirmière de Programmation Saint Joseph :
Frédérique Nudant et Marie Odile Couette

Ideallergo14@hpsj.fr / Tel : 01.44.12.75.99 Fax : 01.44.12.36.04

Joindre les résultats des prélèvements immédiats, feuille d'anesthésie

Déclaration au centre régional de pharmacovigilance, en utilisant le formulaire disponible sur le site sur Blue Medi.

Envoyer un mail à la pharmacienne de Foch a.chan-hew-wai@hopital-foch.com

Délivrer une carte provisoire d'allergie au patient