HOPITAL FOCH	**RESUME D'UTILISATION DES CATECHOLAMINES**	Réf : SSPI Version : 01 Date de création : Novembre 2012 Date de modification : Juin 2019 Page 1 sur 1

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	BRACONNIER A. DUMANS V. CORNET C.	IDE	
Validation de l'expert	LEGUEN M.	MEDECIN	
Approbation	SAINT MARC T.	CADRE SUP	

1. DOMAINE ET CONDITIONS D' APPLICATION

Ce protocole concerne :

Professionnel concerné : ☒ Médecin ☒ Infirmier ☐ Aide-soignant

2. DESCRIPTIONS

Dilution de l'Adrénaline et de la Noradrénaline en fonction des posologies

Noradrénaline : Amp 8 mg (4 ml)

Adrénaline : Amp 5 mg (5 ml)

Sur KT central, voie proximale.

Sur VVP, limiter la perfusion à 6h, car risque d'ischémie des extrémités et risque de nécrose tissulaire en cas de diffusion extravasculaire.

Sur VVP avec prolongateur 3 valves (pieuvre), car risque de flush en cas de prolongateur coudé.

Changement de seringues/12h ou avant si relais

Anticiper les relais une heure avant.

Posologies		< 0,5 mg/h	0,5 à 1 mg/h	1 à 2 mg/h	2 à 10 mg/h	> 10 mg/h
Concentration	**0,16µg/ml**	**0,1 mg/mL**	**0,2 mg/mL**	**0,5 mg/mL**	**1mg/mL**	**2mg/mL**
Adrénaline		5mg / 50mL	10mg / 50mL	25mg / 50mL	50mg / 50mL	
Noradrénaline	8mg/500 ml	4mg (= 2ml) / 40mL	8mg (=4ml) / 40mL	24mg (= 3x4 ml)/ 48mL	48mg (= 6x4 ml)/ 48mL	96mg / 48mL

NE PAS OUBLIER DE NOTER LA DILUTION SUR LES SERINGUES ++++

(ET NON LA VITESSE)