

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	BRACONNIER A. DUMANS V. CORNET C.	IDE	
Validation de l'expert	LEGUEN M.	MEDECIN	
Approbation	SAINT MARC T.	CADRE SUP	

1. DOMAINE ET CONDITIONS D'APPLICATION :

Cette procédure concerne :

Professionnel concerné : Médecin Infirmier Aide-soignant

2. DESCRIPTIONS :

a) Classe médicamenteuse :

Médicament vasopresseur sympathomimétique avec un mécanisme d'action indirect sur les récepteurs alpha et bêta par augmentation de la libération endogène de noradrénaline. Son délai d'action et sa durée d'action courts permettent d'obtenir une vasoconstriction artérielle et veineuse et de corriger rapidement une hypotension artérielle. Elle peut entraîner une élévation de la fréquence cardiaque par son action bêta notamment en cas d'hypovolémie profonde.

b) Indications :

Traitement de l'hypotension artérielle induite par une anesthésie générale

Traitement de l'hypotension après anesthésie rachidienne

Correction d'une hypotension artérielle mal tolérée cliniquement en attendant le traitement étiologique (sepsis, hémorragie...)

c) Précaution/contre-indication :

Coronaropathie non stabilisée (effet tachycardisant et augmentation de la post charge du ventricule gauche)

d) Posologie :

Voie IVD

Titration de 3 à 9 mg toutes les 5 minutes pour obtenir rapidement le contrôle de la PAM

Au-delà de 30 mg, envisager un support par un autre vasopresseur neosynéphrine ou Noradrénaline : cf fiche technique)

e) Préparation

Ampoules de 30 mg dans 10 mL soit 3mg/mL d'éphédrine. A utiliser pure

f) Surveillance

Monitoring de la pression artérielle rapprochée et surveillance clinique chez des patients éveillés.