	PROTOCOLE NVPO	<u>Réf</u> : SSPI <u>Version</u> : 01 <u>Date de création</u> : Décembre 2012 <u>Date de modification</u> : Juin 2019 <u>Date d'application</u> : Décembre 2012

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	BRACONNIER A. DUMANS V. CORNET C.	IDE MAR MAR	
Validation de l'expert	LE GUEN M.	MEDECIN	
Approbation	SAINT MARC T.	CADRE SUP	

1. DOMAINE ET CONDITIONS D' APPLICATION

Cette procédure concerne :

Professionnel concerné : Médecin Infirmier Aide-soignant

2. DESCRIPTIONS

a) Indications


Les nausées et vomissement post opératoires (NVPO) entraînent des prolongations de séjour ou des hospitalisations non prévues.

b) Score d'APFEL:

1 point attribué aux facteurs suivants (Score de 0 à 4)

Femme, non fumeur, ATCD de NVPO ou mal de voiture, recours à la morphine en postopératoire.

c) Algorithme



d) Profil des molécules disponibles

Dropéridol : (Droleptan) = Neuroleptique

Contre Indication = Femme enceinte et allaitement,
Si allongement QT

Zophren : (Sétron)

Propofol : (Diprivan 20 à 30mg) = Hypnotique d'utilisation anesthésique

Indication = NVPO réfractaire, Femme enceinte

Surveillance = Conscience et SpO²,

Surveillance = SSPI 1h après la dernière injection.