

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	BRACONNIER A. DUMANS V. CORNET C.	IDE MAR MAR	
Validation de l'expert	LE GUEN M.	MEDECIN	
Approbation	SAINT MARC T.	CADRE SUP	

1. DOMAINE ET CONDITIONS D'APPLICATION :

Cette procédure concerne :

Professionnel concerné : Médecin Infirmier Aide-soignant

2. DESCRIPTIONS

a) Classe médicamenteuse :

Catécholamine : vasoconstrictrice, stimulant/analeptique cardiaque, alpha mimétique non sélectif, alpha mimétique, bêtamimétique non sélectif, bêtamimétique, sympathomimétique mixte.

b) Indications :

Correction d'une hypotension artérielle mal tolérée cliniquement dans le cadre d'un état de choc septique ou hypovolémique laissant supposer un support vasopresseur prolongé

Correction d'une hypotension artérielle (PAM < 65 mmHg) chez un patient sous analgésie péridurale.

Voie IVSE

Sur pieuvre posologie à adapter à un objectif de pression artérielle à condition d'un bon capital veineux et d'une surveillance clinique de la perfusion rapprochée

Sur cathéter central ou Piccline

c) Préparation

Ampoules de 8 mg (4 ml)

Prendre 4 mg (2 ml) à diluer dans 50 ml de sérum physiologique (= 100 µg/ml)

d) Surveillance

Bien identifier la seringue électrique

Monitoring de la pression artérielle rapprochée et surveillance clinique chez des patients éveillés.

Surveillance de la voie d'abord si site périphérique