HOPITAL FOCH	**PROTOCOLE « BABY-NORADRENALINE »**	Réf : SSPI Version : 01 Date de création : Juin 2019 Date d'application : Juin 2019 Page 1 sur 1

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	BRACONNIER A. DUMANS V. CORNET C.	IDE MAR MAR	
Validation de l'expert	LE GUEN M.	MEDECIN	
Approbation	SAINT MARC T.	CADRE SUP	

1. DOMAINE ET CONDITIONS D'APPLICATION :

Cette procédure concerne :

Professionnel concerné : ☒ Médecin ☒ Infirmier ☐ Aide-soignant

2. DESCRIPTIONS

a) Classe médicamenteuse :

Catécholamine : vasoconstrictrice, stimulant/analeptique cardiaque, alpha mimétique non sélectif, alpha mimétique, bêtamimétique non sélectif, bêtamimétique, sympathomimétique mixte.

b) Indications :

Traitement de l'hypotension artérielle induite par une anesthésie générale

Traitement de l'hypotension après anesthésie rachidienne

Correction d'une hypotension artérielle mal tolérée cliniquement en attendant le traitement étiologique (sepsis, hémorragie…)

Voie IVD

Titration de 8 µg à 32 µg toutes les 5 minutes pour obtenir rapidement le contrôle de la PAM

Voie IVSE

Sur pieuvre posologie à adapter à un objectif de pression artérielle

c) Préparation

Ampoules de 8 mg (4 ml) à diluer dans 500 ml de sérum physiologique (= 16 µg/ml)

d) Surveillance

Monitorage de la pression artérielle rapprochée et surveillance clinique chez des patients éveillés.