

	REMIFENTANIL / ULTIVA	Réf : SSPI
		Version : 02
		Date de création : Mars 2014
		Date de révision : Mars 2019

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	BRACONNIER A.	IDE	
Validation de l'expert	CORNET C.	MEDECIN	
Approbation	SAINT MARC T.	CADRE SUP	

1. DOMAINE ET CONDITIONS D' APPLICATION

Cette procédure concerne :

Professionnel concerné : Médecin Infirmier Aide-soignant

2. DESCRIPTIONS

a) Indications

Le rémifentanyl est un anesthésique opioïde, agoniste des récepteurs morphiniques μ .
Sa demi vie est de 3minutes donc son action est assez courte.

b) Présentation et Préparation

Flacons de 1mg ou de 5mg

c) Posologie

Mettre 5mg de rémifentanyl dans un pochon de 250mL de sérum physiologique puis prendre 50mL de cette dilution

Ou

Mettre 1mg de rémifentanyl dans une seringue de 50mL de sérum physiologique

Concentration = 20 μ g/mL

Brancher cette seringue sur un pousse seringue Alaris PK en mode AIVOC
(AIVOC = Anesthésie IntraVeineuse à Objectif de Concentration)

d) Mise en route de la seringue

Allumer le PSE

Rentrer le poids, taille et age et lancer la procédure selon prescription médicale (Cf)

e) Effets indésirables

Rigidité Musculaire

Bradycardie

HypoTA

Détresse Respiratoire Aigue, apnée

Nausées, vomissements

Prurit