

## ANTIBIOPROPHYLAXIE EN CHIRURGIE THORACIQUE

Acte chirurgical	Antibiotique DCI	Dose initiale	Ré-injection et durée
- Exérèse pulmonaire (y compris chirurgie vidéo-assistée)	Céfuroxime	1,5 g IV lente	Dose unique (si durée > 2 h, réinjecter 0,75g)
- Chirurgie du médiastin - Chirurgie du pneumothorax - Décortication (patient non infecté) - Résection pariétale isolée	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	900 mg  5 mg/kg/j IVSE	Dose unique (si durée > 4 h, réinjecter 600 mg) Dose unique
- Médiastinoscopie, vidéothoracoscopie - Trachéotomie - Drainage thoracique - Drainage péricardique - ECMO	Pas d'ANTIBIOPROPHYLAXIE		
- Chirurgie septique - pyothorax - cancer nécrosé infecté	poursuivre l'antibiothérapie préopératoire en couvrant en plus les cocci gram+ si besoin		

\* Si sécrétions sales en peropératoire. Faire prélèvements bronchiques au bloc, poursuivre l'antibiothérapie en postopératoire, puis adapter l'antibiothérapie en fonction des résultats de l'antibiogramme.