

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	BRACONNIER A.	IDE	
Validation de l'expert	LEGUEN M.	MEDECIN	
Approbation	SAINT MARC T.	CADRE SUP	

1. DOMAINE ET CONDITIONS D' APPLICATION

Ce protocole concerne :

Professionnel concerné : Médecin Infirmier Aide-soignant

2. DESCRIPTIONS

a) Indications

Ce médicament est un anti-hypertenseur qui appartient à la famille des inhibiteurs calciques. Il est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle en post opératoire immédiat.

Tension artérielle systolique > 160mmHg Tension artérielle diastolique > 90mmHg

b) Protocole

Après avis médical et contrôle de la douleur

Titration

- Patient âgé de moins de 70 ans

Titration par **UN MG** à renouveler toutes les 2 minutes si besoin jusqu'à 4 mg puis avis du médecin (objectif de PAM > 65mmHg)

- Patient âgé de plus de 70 ans

Titration par **UN DEMI MG** à renouveler toutes les 2 minutes si besoin jusqu'à 2 mg puis avis du médecin (objectif de PAM > 65mmHg)

Relais

Dès la fin de la titration, informer rapidement le médecin en charge de la SSPI pour prévoir **un relais per os** (Loxen 50mg LP)

c) Contre indications

Coronarien instable (Préférez Bréviploc)
Hémorragie méningée (Préférez Urapidyl)
Pneumopathie (Risque de désaturation)

d) Associations déconseillées

Présence de vasoconstricteurs (Ex : Noradrénaline)

e) Effets indésirables

Tachycardie
Bouffées de chaleur
Hypotension sévère