

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	BRACONNIER A.	IDE	
Validation de l'expert	LEGUEN M.	MEDECIN	
Approbation	SAINT MARC T.	CADRE SUP	

1. DOMAINE ET CONDITIONS D' APPLICATION

Ce protocole concerne :

Professionnel concerné : Médecin Infirmier Aide-soignant

2. DESCRIPTIONS

a) Indications

La morphine est un antalgique de palier 3 ayant un effet dose-dépendant. Il n'existe pas de dose maximale : la dose peut être augmentée jusqu'à l'obtention d'un effet satisfaisant si les effets secondaires restent contrôlables. NB : Un patient sédaté ne signifie pas patient soulagé.

Antidote : la naloxone : Narcan® (0.2mg en titration)

b) Protocole

Après contrôle de l'échelle numérique de douleur

Titration

- Patient âgé de moins de 70 ans

Titration par **5 MG** puis **2.5 MG** à renouveler toutes les 5 minutes si besoin jusqu'à 15 mg puis avis du médecin (objectif de EN < 4)

- Patient âgé de plus de 70 ans, patient « neuro », patient insuffisant rénal (Créat<30)

Titration par **3 MG** puis **2 MG** à renouveler toutes les 5 minutes si besoin jusqu'à 15 mg puis avis du médecin (objectif de EN < 4)

Relais

Dès la fin de la titration, informer rapidement le médecin en charge de la SSPI pour prévoir **un relais per os ou par PCA en IVSE.**

(2h après pour le relais per os, immédiatement après pour la PCA)

c) Contre indications

Score de sédation > 2, Score de respiration > 2, Insuffisance Respiratoire Aiguë, épilepsie non traitée

d) Associations déconseillées

Neuroleptiques

e) Effets indésirables

Dépression Respiratoire, Somnolence, Prurit

Rétention aiguë d'urine, Constipation, Nausées et Vomissements

f) Cas Particuliers

Patient en Ambulatoire : préféré AINS, Tramadol. Ne pas dépasser 0.1mg/kg (soit environ 10mg)

Rachi-Morphine : titration sur prescription médicale (risque majeur de dépression respiratoire)