

	CONDUITE A TENIR EN CAS D'ALLERGIE AU PLASMA VIRO ATTENUÉ PAR LE BLEU DE METHYLENE (PVA-BM)	Réf : choc PVA-BM –02-2010 Version : 1 Date de création : avril 2010 Date d'application : avril 2010
---	--	--

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	SCHLUMBERGER Sylvie LE METAYER Michelle	HEMOVIGILANTE	
Validation de l'expert			
Approbation	D .VIGNON		

1. DOMAINE ET CONDITIONS D' APPLICATION

- Réaction allergique grave au cours ou au décours immédiat d'une transfusion de plasma viro atténué par le bleu de méthylène (PVA-BM) :

2. DOCUMENTS DE REFERENCE

- Lettre AFSSAPS 22 décembre 2008
- Mise au point AFSSAPS Juin 2009

3. DESCRIPTION

- Tableau clinique grave avec : oedème de Quincke, bronchospasme sévère, collapsus cardio-vasculaire, associé ou non à des signes cutanéomuqueux

4. CONDUITE à TENIR : REANIMATION DU PATIENT

- Arrêt de la transfusion
- Garder la voie de perfusion pour la réanimation du patient
- Appel en urgence d'un médecin ou d'emblée d'un réanimateur
- Réanimation du patient : surveillance hémodynamique, oxygénation, Noradrénaline..

5. PRELEVEMENTS SANGUINS : PREVENIR LE LABORATOIRE (4295)

Délai de prélèvement	< 30 min	30 min à 2H	> 24 H
Dosage	Histamine	Tryptase	Tryptase
1 tube	EDTA	EDTA	EDTA

- Faire parvenir au laboratoire les tubes **EDTA** (violet) avec les informations suivantes :
 - Nom et prénom du patient
 - Date de naissance
 - Délai entre choc observé et le prélèvement.
- Joindre impérativement la feuille de renseignements cliniques précisant date et heure du prélèvement + 3 étiquettes et contexte : suspicion allergie PVA-BM
- Tests à distance (6 semaines) en cas de réaction allergique grave :
 - Tests cutanés : prick test, IDR
 - Tests in vitro : test d'activation des basophiles par cytométrie en flux

6. TRAITEMENT DES ECHANTILLONS AU LABORATOIRE

- Centrifuger les tubes EDTA **immédiatement** après le prélèvement (1000g pendant 10 à 15mn)
- Décanter les 2/3 du plasma surnageant dans des tubes secs dûment étiquetés (date).
- **Congeler ce plasma à -20°**
- L'envoi des échantillons au laboratoire Pasteur Cerba se fera par la filière habituelle et dans les mêmes conditions (joindre impérativement les renseignements cliniques)

7. HEMOVIGILANCE

- Prévenir l'EFS (2747) et l'hémovigilance (2812,2817)
- Envoyer rapidement les poches à l'EFS
- Faire la déclaration d'effets indésirables sur BLUEMEDI