

Prise en charge des complications hémorragiques graves et de la chirurgie en urgence chez les patients recevant un anticoagulant oral (anti IIa ou anti Xa direct)

### Rappels

- Les concentrations plasmatiques du Dabigatran et du Rivaroxaban sont disponibles à Foch (pas encore pour l'Apixaban)
- La chirurgie en urgence est possible quand la concentration du Dabigatran ou du Rivaroxaban est inférieure ou égale à 30ng/ml
- La décision d'opérer est fonction de la concentration plasmatique, de l'urgence du geste chirurgical et des facteurs liés au patient : âge, clearance selon Cockcroft, poids...
- Dans les situations d'urgence où on ne peut attendre, on peut utiliser des médicaments pro coagulants (indication hors AMM)
  - CCP : à Foch Octaplex® (Kanokad® si allergie à l'héparine)
  - Pas de FEIBA (CCP activés) à Foch
  - Facteur VIIa (Novoseven®) : jamais en 1<sup>ère</sup> intention

Tableau résumant les indications des différents médicaments ou techniques à utiliser en urgence

	Dabigatran (Pradaxa®)	Rivaroxaban (Xarelto®)	Apixaban (Eliquis®)
Mode d'action	Anti IIa	Anti Xa	Anti Xa
Dialyse	oui	non	non
FEIBA 30 à 50 UI/KG	oui	oui	oui
CCP 25 à 50 UI/Kg	oui	oui	oui
Facteur VIIa	Pas en 1 <sup>ère</sup> intention	Pas en 1 <sup>ère</sup> intention	Pas en 1 <sup>ère</sup> intention

G. Pernod ..... Prise en charge des complications graves et de la chirurgie en urgence chez les patients recevant un anticoagulant oral anti-IIa ou anti-Xa direct. Propositions du Groupe d'Intérêt en Hémostase Périopératoire (GIHP) mars 2013. ANNFAR 2013 Oct (32) (10) 691-700.