

ARTERIOGRAPHIE CEREBRALE

- artériographie de contrôle essentiellement
- ou artériographie diagnostique quand il n'y a pas d'embolisation prévue.
- Dans ces deux cas : se fait sous sédation en ventilation spontanée

Sédation par :

- Sufentanil, +/- associé à l'Hypnovel à faible dose (titrer par mg)
 - >> Mais attention : l'Hypnovel seul diminue beaucoup l'anxiété, mais peut entraîner une agitation et une logorrhée.
- Préférence pour le rémifentanil seul en AIVOC (20 µg/mL, réglage en site effet AIVOC cible augmentée progressivement jusqu'à effet souhaitée, en général de 1 à maximum 4 ng/ml)
- Apport d'oxygène nasal QSP SpO₂ > 95%.
- capnographe

-ATTENTION si embolisation probable l'artériographie se fera sous AG,

- Méningiomes
- Hémorragies méningées en urgence (à discuter avec les neuroradiologues), revoir chapitre spécifique .

AUTRES ARTERIOGRAPHIES

**ARTERIOGRAPHIE MEDULLAIRE (repérage de l'artère d'Adamkiewicz)
ou ARTERIOGRAPHIE DIGESTIVE**

- **AG avec intubation**

- Apnée nécessaire, lors des clichés
- Curarisation le plus souvent nécessaire, car l'absence du moindre mouvement est indispensable pour la réalisation de clichés de qualité.