

ANTIBIOPROPHYLAXIE EN CHIRURGIE DIGESTIVE

Acte chirurgical	Antibiotique DCI	Dose initiale	Ré-injection et durée
- Chirurgie oesophagienne - Chirurgie gastro-duodénale (y compris gastrostomie endoscopique) - Chirurgie pancréatique - Chirurgie hépatique - Chirurgie des voies biliaires - Cholécystectomie	Céfoxitine	2 g IV lente	Dose unique (si durée > 2 h, réinjecter 1g)
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	600 mg 5 mg/kg/j IVSE	Dose unique (si durée > 4 h, réinjecter 600 mg) Dose unique
- Cure d'événtration	Céfazoline	2 g IV lente	Dose unique (si durée > 4 h, réinjecter 1g)
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	600 mg 5 mg/kg	Dose unique (si durée > 4 h, réinjecter 600 mg) Dose unique
- Hernie avec ou sans mise en place d'une plaque prothétique quelle que soit la voie d'abord - Thyroïdectomie	Pas d'ATB	Pas d'ATB	
- Chirurgie de l'intestin grêle (y compris anastomose bilio-digestive) - Chirurgie colorectale et appendiculaire* (y compris plastie colique) - Plaies de l'abdomen	Céfoxitine	2 g IV lente	Dose unique (si durée > 2 h, réinjecter 1g)
	Allergie : Imidazolé + Gentamicine	1g (perfusion) 5 mg/kg/j IVSE	Dose unique Dose unique
Chirurgie proctologique	Imidazolé	1g (perfusion)	Dose unique
- Rétablissement de continuité - Contamination du champ opératoire à l'ouverture	Amoxicilline, acide clavulanique** + Gentamicine	2 g IV lente 5 mg/kg/j IVSE	Ré-injection de 1g/2h en peropératoire puis 1 g toutes les 6h pendant 48h Dose unique
	Allergie : Imidazolé + Gentamicine	1g (perfusion) 5 mg/kg/j IVSE	500 mg/8h pendant 48h Dose unique

Dr B. Szekely le 25/07/2014

Validé en chirurgie digestive et par la COMAI et le CLIN le 18/09/2014

Service Anesthésie Pr Fischler

- péritonite (y compris appendice perforé). <i>*Antibiothérapie indicative à adapter et à poursuivre en fonction des résultats bactériologiques</i>	Amoxicilline, acide clavulanique** +	2 g IV lente	Ré-injection de 1g/2h en peropératoire puis 1 g toutes les 6h
	Gentamicine	5 mg/kg/j IVSE	Dose unique
	Allergie : Imidazolé +	1g (perfusion)	500 mg/8h
	Gentamicine	5 mg/kg/j IVSE	Dose unique

*Appendice normal ou inflammatoire et absence d'abcès, de perforation, de gangrène...

** AUGMENTIN® : amoxicilline, acide clavulanique

**Rappel : chez l'obèse (IMC > 35 kg/m²), doubler la dose des β-lactamines (dose initiale et dose de réinjection).
Vancomycine : 15 mg/kg ; gentamicine 5 mg/kg (dose maximale 500 mg), clindamycine dose maximale 900 mg.**