

# HOPITAL FOCH

Etiquette Patient

## EVALUATION DU RISQUE THROMBO-EMBOLIQUE ET SCHEMA THERAPEUTIQUE CHIRURGIE DIGESTIVE

RISQUE LIE A LA CHIRURGIE		RISQUE LIE AU MALADE		Risque Chirurgie	Risque Malade	RISQUE THROMBO-EMBOLIQUE	SCHEMA THERAPEUTIQUE RECOMMANDE	
- intervention < 1 heure *	1	- absence de facteur de risque thrombo-embolique autre que l'âge	1	1	1	FAIBLE	Bas Anti-thrombose	
- chirurgie non néoplasique > 1 heure - sepsis - maladies inflammatoires *	2	- âge > 40 ans - contraception orale par oestroprogestatifset/ou THS - cardiopathie décompensée - alitement péri-opératoire > 4 jours - varices - infection pré-op. généralisée ou localisée aiguë - post-partum (1 mois) - obésité le risque est augmenté en présence de plusieurs facteurs de risque.	2		2	MODERE	+	Bas Anti-thrombose 20 mg H 6 Post opératoire Lovenox
					3			
- chirurgie néoplasique - hématologie - coelioscopie >1 heure		- cancer actuel ou évolutif - antécédent thrombo-embolique - paralysie des membres inférieurs (après accident vasculaire cérébral, par exemple) - syndrome myéloprolifératif - hypercoagulabilité : - déficit connu en protéine C et S, en AT III - résistance à la protéine C activée - anticoagulant circulant - anticorps antiphospholipides	3	3	1	ELEVE	Bas anti-thrombose + Lovenox 40mg 1 ère injection sous cutanée 12 h avant l'intervention puis une injection sous cutanée par jour (au plus tôt à H 6)	
			2					
			3					

\* Les dissections étendues et/ou hémorragiques et/ou de durée anormalement prolongée font passer les interventions du risque chirurgical 1 au risque chirurgical 2, ou du risque 2 au risque 3.

**CHIRURGIEN** - Date :

Signature :

**EN CAS D'ANESTHESIE RACHIDIENNE (ALR)  
PAS DE LOVENOX AVANT L'INTERVENTION**

**ANESTHESISTE** - Date :

Signature :