

	<b>RECOMMANDATIONS - PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR EN CHIRURGIE GYNECO-OBSTETRIQUE</b>	<b>Réf :</b> <b>Version :</b> 1 <b>Date de création :</b> 27/11/2009 <b>Date d'application :</b> 01/01/2010

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	Christine GERVAIS	Responsable de l'Unité Douleur	
Validation de l'expert	Michel CHANDON	Médecin anesthésiste	
	Mireille MICHEL CHERQUI	Médecin anesthésiste	
	Christophe PINET	Chirurgien référent douleur	
Approbation	Barbara SZEKELY	Médecin anesthésiste, présidente du CLUD	

## 1. DOMAINE ET CONDITIONS D' APPLICATION

Recommandations de la prise en charge de la douleur dans les services de chirurgie "Gyneco-obstétrique".

Ce tableau identifie pour chaque type d'intervention, le traitement antalgique à administrer en prémédication, au bloc opératoire, en SPPI et/ou en réanimation, puis dans le service d'hospitalisation.

Personnel concerné : chirurgien, médecin, anesthésiste, cadre de santé, infirmière.

## 2. DESCRIPTION

	Prémédication	BLOC OPERATOIRE	SSPI / REA	SERVICE
<b>Césarienne</b>	Paracétamol	Néfopam Péri-rachi programmée Péri, ou rachi ou AG si urgence	Paracétamol Néfopam Kétoprofène Cf. protoc. spécifique	Paracétamol Néfopam Kétoprofène Cf. protoc. spécifique
<b>Accouchement VB</b>				Paracétamol Néfopam

Chirurgie gynécologique voie haute	Paracétamol	Néfopam Kétamine Titration morphine	Paracétamol Néfopam Titration morphine Relais PCA ou morphine s/cut.	Paracétamol Néfopam PCA ou morphine s/cut. Relais sevredol
Chirurgie gynécologique voie basse Sein	Paracétamol	Néfopam Titration morphine	Paracétamol Néfopam Titration morphine Relais s/cut.	Paracétamol Néfopam Morphine s/cut. 1 <sup>e</sup> nuit Relais sevredol
Curetage Hystérocopie Ambulatoire	Paracétamol	Néfopam	Paracétamol ou Paracétamol codéine Néfopam	Paracétamol ou Paracétamol codéine Néfopam <b>Sortie</b> Paracétamol ou Paracétamol codéine
NVPO		Si Apfel > ou = 2 Célestène 4 mg début I° Droleptan 1,25 mg fin I°	Zophren 4 mg x 4/j	Zophren 4 mg x 4/j
Constipation (morphiniques)			Movicol 1 sachet à 7h	Movicol 1 à 3 sachets à 7h
Globe vésical			BladderScan avant remontée +/- sondage	
Soins douloureux (ablations de drains)				Sevredol 10 ou 20 mg ou morphine SC 10 mg H -1 et/ou MEOPA