

	<b>RECOMMANDATIONS - PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR EN CHIRURGIE THORACIQUE</b>	<b>Réf :</b> <b>Version :</b> 1 <b>Date de création :</b> 27/11/2009 <b>Date d'application :</b> 01/01/2010

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	Christine GERVAIS	Responsable de l'Unité Douleur	
Validation de l'expert	Michel CHANDON	Médecin anesthésiste	
	Mireille MICHEL CHERQUI	Médecin anesthésiste	
	Arlette COLCHEN	Médecin pneumologue référent douleur	
	Michel LEROY	Médecin pneumologue référent douleur	
Approbation	Barbara SZEKELY	Médecin anesthésiste, présidente du CLUD	

## 1. DOMAINE ET CONDITIONS D' APPLICATION

Recommandations de la prise en charge de la douleur dans les services de chirurgie thoracique.

Ce tableau identifie pour chaque type d'intervention, le traitement antalgique à administrer en prémédication, au bloc opératoire, en SPPI et/ou en réanimation, puis dans le service d'hospitalisation.

**Personnel concerné** : chirurgien, médecin, anesthésiste, cadre de santé, infirmière.

## 2. DESCRIPTION

	PREMEDICATION	BLOC OPERATOIRE	SSPI / Réa	SERVICE
Thyroïde Médiastinoscopie	Paracétamol	Néfopam	Paracétamol Néfopam +/- Titration morphine relais Sevredol	Paracétamol Néfopam +/- Sevredol
Endoscopie	Paracétamol	Néfopam	Paracétamol +/- titration	Paracétamol

			morphine	
Thoracoscopie +/- talcage	Paracétamol	Néfopam Infiltration AL	Paracétamol Néfopam Titration morphine relais PCA	Paracétamol Néfopam PCA morphine
Thoracotomie (avec péridurale thoracique)	Paracétamol	Néfopam Kétamine PCEA (cf.protoc) +/- Kétoprofène	Paracétamol Néfopam PCEA (cf.protoc. ajustement) +/- Kétoprofène	Paracétamol Néfopam PCEA (cf. protoc) +/- Kétoprofène
Thoracotomie (avec rachianesthésie morphine)	Paracétamol	Néfopam Kétamine titration morphine +/- Kétoprofène	Paracétamol Néfopam Titration morphine Puis PCA +/- Kétoprofène	Paracétamol Néfopam PCA morphine +/- Kétoprofène
Thoracotomie (avec cathéter paravertébral)	Paracétamol	Néfopam Kétamine +/- Kétoprofène titration morphine KT paravertébral (cf. protoc)	Paracétamol Néfopam +/- Kétoprofène Titration morphine Puis PCA KT paravertébral (cf. protoc)	Paracétamol Néfopam +/- Kétoprofène PCA morphine KT paravertébral (cf. protoc)
Thoracotomie (sans péridurale thoracique)	Paracétamol	Néfopam Kétamine +/- Kétoprofène titration morphine infiltration AL	Paracétamol Néfopam Titration morphine Puis PCA +/- Kétoprofène	Paracétamol Néfopam PCA morphine +/- Kétoprofène
Sternotomie	Paracétamol	Néfopam kétamine Titration morphine	Paracétamol Néfopam +/- Kétoprofène Titration morphine	Paracétamol Néfopam +/- Kétoprofène PCA ou morphine s/cut.

			Relais PCA	
NVPO		Si Apfel > ou = 2 Célestène 4 mg début I° Droleptan 1,25 mg fin I°	Zophren 4 mg x 4/j	Zophren 4 mg x 4/j
Constipation (morphiniques)			Movicol 1 sachet à 7h ou Motilium/Sorbitol	Movicol 1 à 3 sachets à 7h ou Motilium/Sorbitol
Globe vésical			BladderScan avant remontée +/- sondage	
Soins douloureux (ablation de drain...)				Bolus médecin si PCEA, PCA, Sevredol 10 ou 20 mg, ou morphine sous/cut 10 mg, ou MEOPA