

	RECOMMANDATIONS - PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR EN CHIRURGIE UROLOGIQUE	Réf : Version : 1 Date de création : 27/11/2009 Date d'application : 01/01/2010

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	Christine GERVAIS	Responsable de l'Unité Douleur	
Validation de l'expert	Michel CHANDON	Médecin anesthésiste	
	Mireille MICHEL CHERQUI	Médecin anesthésiste	
	Cécile BACH et Martine BUTREAU	Médecins référents douleur	
Approbation	Barbara SZEKELY	Médecin anesthésiste, présidente du CLUD	

1. DOMAINE ET CONDITIONS D' APPLICATION

Recommandations de la prise en charge de la douleur dans les services de chirurgie urologique.

Ce tableau identifie pour chaque type d'intervention, le traitement antalgique à administrer en prémédication, au bloc opératoire, en SPPI et/ou en réanimation, puis dans le service d'hospitalisation.

Personnel concerné : chirurgien, médecin, anesthésiste, cadre de santé, infirmière.

2. DESCRIPTION

	PREMEDICATION	BLOC OPERATOIRE	SSPI / REA	SERVICE
NLPC	Paracétamol	Néfopam	Paracétamol +/-titration morphine relais morphine s/cut. ou Sevredol, éventuellement PCA	Paracétamol Nefopam Morphine s/cut. ou Sevredol

Endoscopie	Paracétamol	Néfopam	Paracétamol Néfopam Ditropan ½ cp x 3 si poussées sur sonde +/-rarement titration morphine	Paracétamol Néfopam +/- relais Sevredol
Chirurgie OGE TVT, TOT	Paracétamol	Néfopam	Paracétamol Néfopam +/- Titration morphine relais Sevredol	Paracétamol Néfopam +/- Sevredol
Adénome prostate voie haute, chirurgie cœlioscopique	Paracétamol	Néfopam Titration morphine	Paracétamol Néfopam Titration morphine Relais morphine s/cut. ou PCA	Paracétamol Néfopam Relais morphine s/cut. ou PCA
Néphrectomie, TX rénale, cystectomie, surrénalectomie, pyéloplastie	Paracétamol	Néfopam Kétamine Titration morphine	Paracétamol Néfopam Titration morphine Relais morphine s/cut. ou PCA	Paracétamol Néfopam PCA ou morphine s/cut.
NVPO		Si Apfel > ou = 2 Célestène 4 mg début I° Droleptan 1,25 mg fin I°	Zophren 4 mg x 4/j	Zophren 4 mg x 4/j
Constipation (morphiniques)			Movicol 1 sachet à 7h	Movicol 1 à 3 sachets à 7h
Globe vésical			BladderScan avant remontée +/- sondage	