

FICHE PRATIQUE EMBOLIE AMNIOTIQUE

J'y pense devant

- Une défaillance hémodynamique : collapsus cardiovasculaire, syndrome cave supérieur suivi d'un OAP, Arrêt cardiaque
- Une détresse respiratoire : hypoxie , cyanose, paleur
- Des convulsions /un coma / une grande agitation, sensation de mort imminente
- Une hémorragie grave d'emblée, CIVD, Fibrinolyse
- Souffrance fœtale aigue

Appel à l'aide +++

Extraction foetale (si non déjà réalisée)

Vérification du dossier transfusionnel (appel au CTS : 2747)

Traitement symptomatique

- IOT , FIO2 100%
- Remplissage , drogues inotropes
- Correction coagulopathie : CG, PFC, Fg, Plaquettes, ac tranexanique, (pas de Novoseven®)
- Si ACR : MCE, défibrillation, adrénaline...
- ECMO en cas de sidération myocardique
- NO en cas d'HTAP
- Traitement chirurgical de l'hémorragie : embolisation, ligature, capitonnage, hystérectomie...

Monitoring

- KT artériel, KT central
- **Echo cœur (ETO)**

Prélèvements

- NFS, iono, GDS, troponine i
- Hémostase, TEG
- **Kit embolie amniotique** : Sang maternel : 3 tubes EDTA
LBA : 1 tube EDTA + 1 flacon d'aspiration