

## ANTIBIOPROPHYLAXIE EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE

Acte chirurgical	Antibiotique DCI	Dose initiale	Ré-injection et durée
- Gastrostomie endoscopique - Sclérose de varices oesophagiennes	Amoxicilline, acide clavulanique**	2 g IV lente	Dose unique
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	600 mg IVSE  5 mg/kg	Dose unique  Dose unique
- Ponction sous écho endoscopie (de kystes pancréatiques) ou trans colique	Amoxicilline, acide clavulanique** (à la demande du gastroentérologue)	2 g IV lente	Dose unique
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine (à la demande du gastroentérologue)	600 mg IVSE  5 mg/kg	Dose unique  Dose unique
- Cholangio rétrograde (CPRE) - Sphinctérotomie	Céfotaxime (à la demande du gastroentérologue)	2 g IV lente	Dose unique (vérifier poursuite et durée des ATB en postopératoire)
	Allergie : Ciprofloxacine (à la demande du gastroentérologue)	400 mg IVL	Dose unique (vérifier poursuite et durée des ATB en postopératoire)
- Coloscopie ou Fibroscopie (sans cirrhose) - Ligature de VO - Prothèse oesophagienne - Coloscopie ou Fibroscopie avec cirrhose	Pas d'ATB		
- Drainage biliaire pour obstruction cancéreuse ou bénigne, ou lithiase (prothèse biliaire par voie transhépatique)	Traitement curatif Poursuite du traitement en cours		(vérifier poursuite et durée des ATB en postopératoire)

\*\* AUGMENTIN® : amoxicilline, acide clavulanique

**Rappel : chez l'obèse (IMC > 35 kg/m<sup>2</sup>), doubler la dose des β-lactamines (dose initiale et dose de réinjection).  
Vancomycine : 15 mg/kg ; gentamicine 5 mg/kg (dose maximale 500 mg), clindamycine dose maximale 900 mg.**

Dr B. Szekely le 25/07/2014

Validé en endoscopie digestive et par la COMAI et le CLIN le 18/09/2014

Service Anesthésie Pr Fischler

