

# HOPITAL FOCH

Etiquette Patient

## EVALUATION DU RISQUE THROMBO-EMBOLIQUE ET SCHEMA THERAPEUTIQUE CHIRURGIE GYNECO - OBSTETRIQUE

RISQUE LIE A LA CHIRURGIE	RISQUE LIE AU MALADE	Risque Chirurgie	Risque Malade	RISQUE THROMBO-EMBOLIQUE	SCHEMA THERAPEUTIQUE RECOMMANDE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- curetage</li> <li>- hystéroscopie</li> <li>- coelioscopie diagnostique ou &lt;1heure</li> <li>- chirurgie "bénigne" du sein</li> <li>- cure de bartholinite</li> <li>- ponction d'ovocyte sous échographie</li> <li>- tumorectomie pour cancer du sein avec curage axillaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- absence de facteur de risque thrombo-embolique autre que l'âge</li> </ul>	1	1	<b>FAIBLE</b>	Aucun traitement médicamenteux n'est nécessaire
<ul style="list-style-type: none"> <li>- hystérectomie (voie haute ou basse)</li> <li>- myomectomie, annexectomie</li> <li>- colpopubofixation isolée (Burch)</li> <li>- plastie tubaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- âge &gt; 40 ans</li> <li>- contraception orale par oestroprogestatifs et/ou THS</li> <li>- cardiopathie décompensée</li> <li>- alitement péri-opératoire &gt; 4 jours</li> <li>- varices</li> <li>- infection pré-op. généralisée ou localisée aiguë</li> <li>- post-partum (1 mois)</li> <li>- obésité</li> </ul> <p><b>le risque est augmenté en présence de plusieurs facteurs de risque.</b></p>	2	2	<b>MODERE</b>	<p><b>Bas anti-thrombose</b></p> <p>+</p> <p><b>Lovenox 20 mg</b> <b>H 6 Post opératoire</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- plastie utérine</li> <li>- traitement du prolapsus (voie combinée)</li> <li>- cancer sphère génitale (sauf sein) césarienne</li> <li>- coeliochirurgie &gt;1 heure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cancer actuel ou évolutif</li> <li>- antécédent thrombo-embolique</li> <li>- paralysie des membres inférieurs (après accident vasculaire cérébral, par exemple)</li> <li>- syndrome myéloprolifératif</li> <li>- hypercoagulabilité :</li> <li>- déficit connus en protéine C et S, en AT III</li> <li>- résistance à la protéine C activée</li> <li>- anticoagulant circulant</li> <li>- anticorps antiphospholipides</li> </ul>	3	3	<b>ELEVE</b>	<p><b>Bas anti-thrombose</b></p> <p>+</p> <p><b>Lovenox 40mg</b></p> <p>1 ère injection sous cutanée 12 h avant l'intervention puis une injection sous cutanée par jour (au plus tôt à H 6)</p>

\* Les dissections étendues et/ou hémorragiques et/ou de durée anormalement prolongée font passer les interventions du risque chirurgical 1 au risque chirurgical 2, ou du risque 2 au risque 3.

**CHIRURGIEN** - Date :

Signature :

**EN CAS D'ANESTHESIE RACHIDIENNE (ALR)  
PAS DE LOVENOX AVANT L'INTERVENTION**

**ANESTHESISTE** - Date :

Signature :