	PROTOCOLE NVPO		Réf : SSPI Version : 01 Date de création : Décembre 2012 Date d'application : Décembre 2012

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	BRACONNIER A.	IDE	
Validation de l'expert	LEGUEN M.	MEDECIN	
Approbation	SAINTE MARC T.	CADRE SUP	

1. DOMAINE ET CONDITIONS D'APPLICATION

Cette procédure concerne :

Professionnel concerné : Médecin Infirmier Aide-soignant

2. DESCRIPTIONS

a) Indications


Les nausées et vomissement post opératoires (NVPO) entraînent des prolongations de séjour ou des hospitalisations non prévues.

b) Score d'APFEL:

1 point attribué aux facteurs suivants (Score de 0 à 4)

Femme, non fumeur, ATCD de NVPO ou mal de voiture, recours à la morphine en postopératoire.

c) Algorithme



d) Profil des molécules disponibles

Dropéridol : (Droleptan®) = neuroleptique

Contre Indication = Femme enceinte et allaitement

Zophren® : (ondansétron)

Propofol : (Diprivan® 20 à 30mg) = Hypnotique

Indication = NVPO réfractaire, femme enceinte

Surveillance = conscience et SpO², reste en SSPI 1 h après injection.