

ANTIBIOPROPHYLAXIE EN CHIRURGIE ORL,

Acte chirurgical	Antibiotique DCI	Dose initiale	Ré-injection et durée
OTOLOGIE : Chirurgie de l'étrier, de l'oreille propre : - tympanoplastie, - myringoplastie, - stapéctomie. <i>Si oreille inflammatoire, continuer l'antibiothérapie en cours.</i>	Pas d'ATB		
OTONEUROCHIRURGIE, chirurgie de la face, du cou et chirurgie endonasale avec temps neurochirurgical (crâniatisation des sinus frontaux ...)	Céfazoline	2 g IV lente	Dose unique (si durée > 4 h, réinjecter 1g)
	Allergie : Vancomycine*	15 mg/kg IVSE en 1h	Dose unique
RHINOLOGIE : Chirurgie avec méchage < 48h. - septoplastie - turbinectomie - méatotomie - Ethmoïdectomie - Rhinoplastie (sans implant) - Rhinoplastie avec mise en place d'un greffon, reprise chirurgicale ou rhinoplastie secondaire	Pas d'ATB		
	Céfazoline	2 g IV lente	Dose unique
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	600 mg 5 mg/kg/j IVSE	Dose unique Dose unique

Chirurgie naso-sinusienne avec méchage >48h.	amoxicilline, acide clavulanique**	2 g IV lente	Ré-injection de 1g/2h en peropératoire puis 1 g toutes les 6h pendant 24h
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	600 mg 5 mg/kg/j IVSE	Ré-injection de 600 mg si durée > 4h puis 600 mg/6h pendant 24h Dose unique
CHIRURGIE DE LA CAVITE BUCCALE : - Amygdalectomie - Chirurgie vélo-pharyngée.	Pas d'ATB		
CHIRURGIE CERVICO-FACIALE : Chirurgie carcinologique ou chirurgie septique ou avec ouverture buccale, pharyngée ou laryngée : laryngectomie, BPTM, glossectomie, pelvectomie...	Amoxicilline, acide clavulanique**	2 g IV lente	Ré-injection de 1g/2h en peropératoire puis 1 g toutes les 6h pendant 24h
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	600 mg 5 mg/kg/j IVSE	Ré-injection de 600 mg si durée > 4h puis 600 mg/6h pendant 24h Dose unique
Chirurgie cervico-faciale propre (sans ouverture buccale): - thyroïdectomie, - Chirurgie des glandes salivaires, parotidectomie, - Cervicotomie - curage ganglionnaire	Pas d'ATB		

** AUGMENTIN® : amoxicilline, acide clavulanique

- La présence d'un drainage n'est pas un argument pour prolonger la durée de l'antibioprophylaxie.

**Rappel : chez l'obèse (IMC > 35 kg/m²), doubler la dose des β-lactamines (dose initiale et dose de réinjection).
Vancomycine : 15 mg/kg ; gentamicine 5 mg/kg (dose maximale 500 mg), clindamycine dose maximale 900 mg.**