

HOPITAL FOCH

Etiquette Patient

EVALUATION DU RISQUE THROMBO-EMBOLIQUE ET SCHEMA THERAPEUTIQUE CHIRURGIE ORL

RISQUE LIE A LA CHIRURGIE		RISQUE LIE AU MALADE		Risque Chirurgie	Risque Malade	RISQUE THROMBO-EMBOLIQUE	SCHEMA THERAPEUTIQUE RECOMMANDE
<ul style="list-style-type: none"> - cervicotomie exploratrice - thyroïdectomie - adénectomie, parotidectomie - chirurgie de l'oreille rhinologie (septoplastie, turbinectomie, rhinoplastie, méatotomie) - chirurgie du ronflement simple - Endo ORL 	1	<ul style="list-style-type: none"> - absence de facteur de risque thrombo-embolique autre que l'âge 	1	1	1	FAIBLE	Aucun traitement médicamenteux n'est nécessaire
<ul style="list-style-type: none"> - chirurgie carcinologique du larynx de l'oropharynx du pharynx de la thyroïde - Endo ORL - chirurgie avec temps neuro chirurgical 	2	<ul style="list-style-type: none"> - âge > 40 ans - contraception orale par oestroprogestatifs + THS - cardiopathie décompensée - alitement péri-opératoire > 4 jours - varices - infection pré-op. généralisée ou localisée aiguë - post-partum (1 mois) - obésité <p>Le risque est augmenté en présence de plusieurs facteurs de risque.</p>	2	2	2	MODERE	Bas Anti-thrombose
<ul style="list-style-type: none"> - neurinome de l'acoustique - chirurgie du syndrome d'apnée du sommeil sévère : avancée bimaxillaire - basiglossectomie 	3	<ul style="list-style-type: none"> - cancer actuel ou évolutif - antécédent thrombo-embolique - paralysie des membres inférieurs (après accident vasculaire cérébral, par exemple) - syndrome myéloprolifératif - déficit connus en protéine C et S, en AT III - résistance à la protéine C activée - anticoagulant circulant - anticorps antiphospholipides 	3	3	3	ELEVE	Bas anti-thrombose + Lovenox 20 mg H 6 Post opératoire (sauf si temps neuro chirurgical, à discuter)

* Les dissections étendues et/ou hémorragiques et/ou de durée anormalement prolongée font passer les interventions du risque chirurgical 1 au risque chirurgical 2, ou du risque 2 au risque 3.

CHIRURGIEN - Date :

Signature :

EN CAS D'ENDOSCOPIE ORL : PAS DE LOVENOX AVANT L'INTERVENTION

(sauf cas particuliers)

ANESTHESISTE - Date :

Signature :