ANTIBIOPROPHYLAXIE EN RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

Acte chirurgical	**Antibiotique DCI**	**Dose initiale**	**Ré-injection et durée**
- Embolisation de fibrome utérin - Ponction sous échographie - Radiofréquence - Cathéter et chambre implantable - Angiographie, angioplastie - neuroradiologie interventionnelle	Pas d'ATB		
- Drainage biliaire pour obstruction cancéreuse ou bénigne, ou lithiase (prothèse biliaire par voie transhépatique)	Traitement curatif *Poursuite du traitement en cours*		
- Drainage biliaire pour ictère (sans angiocholite)	Céfotaxime	2g IV lente	Dose unique *(vérifier poursuite et durée des ATB en postopératoire)*
	Allergie : Ciprofloxacine	400 mg IVL	Dose unique *(vérifier poursuite et durée des ATB en postopératoire)*
- Pose de sonde de gastrostomie	Amoxicilline, acide clavulanique*	2 g IV lente	Dose unique
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	600 mg 5 mg/kg	Dose unique Dose unique
- Endoprothèse artérielle, stent (sauf intra-coronaire)	Céfamandole	1,5 g IV lente	Dose unique (si durée > 2h, réinjecter 0,75 g)
	Allergie : Vancomycine**	15 mg/kg/60 min	Dose unique

Dr B. Szekely le 25/07/2014
Validé en radiologie interventionnelle et par la COMAI et le CLIN le 18/09/2014
Service Anesthésie Pr Fischler

Vertébroplastie	Céfazoline	2 g IV lente	Dose unique (si durée > 4 h, réinjecter 1g)
	Allergie : Vancomycine**	15 mg/kg/60 min	Dose unique
Chimioembolisation de tumeur hépatique	Amoxicilline, acide clavulanique*	2 g IV lente	Dose unique
	Allergie : Ofloxacine + métronidazole	400 mg en perfusion 1 g (perfusion)	Dose unique Dose unique

* AUGMENTIN® : Amoxicilline, acide clavulanique
** Indications de la Vancomycine :
- allergie aux bêta-lactamines,
- colonisation suspectée ou prouvée par du staphylocoque méticilline-résistant, ré-intervention chez un malade hospitalisé dans une unité avec une écologie à staphylocoque méticilline-résistant, antibiothérapie antérieure...
L'injection dure 60 minutes et doit se terminer au plus tard lors du début de l'intervention

Rappel : chez l'obèse (IMC > 35 kg/m2), doubler la dose des β-lactamines (dose initiale et dose de réinjection).

Vancomycine : 15 mg/kg ; gentamicine 5 mg/kg (dose maximale 500 mg), clindamycine dose maximale 900 mg.