

## ANTIBIOPROPHYLAXIE EN CHIRURGIE THORACIQUE

Acte chirurgical	Antibiotique DCI	Dose initiale	Ré-injection et durée
- Exérèse pulmonaire (y compris chirurgie vidéo-assistée) - Chirurgie du médiastin - Chirurgie du pneumothorax - Décortication (patient non infecté) - Résection pariétale isolée	Céfamandole	1,5 g IV lente	Dose unique (si durée > 2 h, réinjecter 0,75g)
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	600 mg  5 mg/kg/j IVSE	Dose unique (si durée > 4 h, réinjecter 600 mg) Dose unique
- Médiastinoscopie, vidéothoracoscopie - Trachéotomie - Drainage thoracique - Drainage péricardique - ECMO	Pas d'ATB		
- Chirurgie septique - pyothorax - cancer nécrosé infecté	poursuivre l'antibiothérapie préopératoire en couvrant en plus les cocci gram+ si besoin		

\* Si sécrétions sales en peropératoire. Faire prélèvements bronchiques au bloc, poursuivre l'antibiothérapie en postopératoire, puis adapter l'antibiothérapie en fonction des résultats de l'antibiogramme.

**Rappel : chez l'obèse (IMC > 35 kg/m<sup>2</sup>), doubler la dose des β-lactamines (dose initiale et dose de réinjection).  
Vancomycine : 15 mg/kg ; gentamicine 5 mg/kg (dose maximale 500 mg), clindamycine dose maximale 900 mg.**