

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	BRACONNIER A.	IDE	
Validation de l'expert	LEGUEN M.	MEDECIN	
Approbation	SAINT MARC T.	CADRE SUP	

1. DOMAINE ET CONDITIONS D'APPLICATION

Ce protocole concerne :

Professionnel concerné : Médecin Infirmier Aide-soignant

2. DESCRIPTIONS

a) Indications

Ce médicament est un anti-hypertenseur qui appartient à la famille des vasodilatateurs. Il est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle en post opératoire immédiat. (en alternative avec le Loxen®)

Tension artérielle systolique > 160mmHg Tension artérielle diastolique > 90mmHg

b) Protocole

Après avis médical et contrôle de la douleur

Titration

- Patient âgé de moins de 70 ans
Titration par **DIX MG** à renouveler toutes les 2 minutes si besoin jusqu'à 50 mg puis avis du médecin (objectif de PAM > 65mmHg)
- Patient âgé de plus de 70 ans
Titration par **CINQ MG** à renouveler toutes les 2 minutes si besoin jusqu'à 25 mg puis avis du médecin (objectif de PAM > 65mmHg)

c) Contre indications

Rétrécissement Aortique Serré

d) Associations déconseillées

Alpha bloquants (Xatral®, Ditropan®) : risque majoré d'hypotension artérielle

e) Effets indésirables

Troubles cardiovasculaires : palpitations, tachycardie

Troubles digestifs : nausées

Troubles du système nerveux central : sueurs, vertiges, céphalées