

	<b>Procédure d'administration des traitements en salle de réveil AMP</b>	Réf : Version : 1 <sup>ere</sup> Date de création : 13.06.2017 Date d'application : 20.11.2017 Page 1 sur 2
---	--	---

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	Dr Elodie ADDA HERZOG	Clinicien	13.06.2017
Validation de l'expert	Pr Renato FANCHIN	Clinitien	
Approbation	Mr Thierry SAINT MARC Dr Morgan LEGUEN	Cadre superieure Clinitien	

## 1. OBJET

Procédure d'administration des antalgiques et de l'antibioprophylaxie en salle de réveil AMP.

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

Service d'AMP

## 3. DOCUMENTS DE REFERENCE

Documents internes :

Antibioprophylaxie dans le cadre de la FIV-ET

Référentiel Foch de prise en charge de la douleur

## 4. ANTIBIOTHERAPIE

### **Augmentin 1g P.O. une heure avant la ponction**

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux substances actives, aux pénicillines ou à l'un des excipients.
- Antécédents de réaction d'hypersensibilité immédiate sévère (par ex., anaphylaxie) à une autre bêta-lactamine (par ex., une céphalosporine, un carbapénème ou un monobactame).
- Antécédents d'ictère/atteinte hépatique liés à l'amoxicilline/acide clavulanique.

### **En cas d'allergie, Tavanic 500mg P.O. une heure avant la ponction**

Contre-indications :

- Allergie aux antibiotiques de la famille des quinolones.
- Antécédent de tendinite lors de l'utilisation d'une quinolone.
- Epilepsie.

**S'il existe un risque majoré d'infection post ponction<sup>1</sup>, on associera la Cefixime 200mg \* 2 / j** que l'on démarrera le soir de la ponction et que l'on poursuivra jusqu'au transfert sauf contre-indications :

- Allergie connue aux antibiotiques du groupe des céphalosporines.
- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament.

En cas d'allergie à la céfixime, on associera le Tavanic : 500 mg P.O. \* 2 / j que l'on démarrera le soir de la ponction et que l'on poursuivra jusqu'au transfert.

<sup>1</sup> *Facteurs de risque d'infection post ponction : endométriose, antécédent d'infection pelvienne, adhérences pelviennes massives, hydrosalpinx*

## **5. ANTALGIQUES**

### **Prémédication**

A l'arrivée de la patiente donner :

- 2 comprimé de Doliprane 500 mg sauf contre-indications :
  - Prise de paracétamol dans les 4 heures précédentes.
  - Maladie du foie (cirrhose, hépatite, ictère ...).
  - Allergie ou hypersensibilité au paracétamol
  
- 2 comprimé de Profénid 50 mg sauf contre-indications :
  - Allergie ou hypersensibilité aux anti inflammatoires
  - Insuffisance rénale sévère
  - Insuffisance hépatique sévère