

## ANTIBIOPROPHYLAXIE EN CHIRURGIE DIGESTIVE

Acte chirurgical	Antibiotique DCI	Dose initiale	Ré-injection et durée
- Chirurgie oesophagienne - Chirurgie gastro-duodénale (y compris gastrostomie endoscopique) - Chirurgie pancréatique - Chirurgie hépatique - Chirurgie des voies biliaires - <b>Cholécystectomie</b>	<b>Céfazoline</b>	2 g IV lente	Dose unique (si durée > 2 h, réinjecter 1g)
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	<b>900 mg</b> 5 mg/kg/j IVSE	Dose unique (si durée > 4 h, réinjecter 600 mg) Dose unique
- Cure d'événtration - <b>Hernie avec mise en place d'une plaque quelle que soit la voie d'abord</b>	Céfazoline	2 g IV lente	Dose unique (si durée > 4 h, réinjecter 1g)
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	<b>900 mg</b> 5 mg/kg	Dose unique (si durée > 4 h, réinjecter 600 mg) Dose unique
- Hernie sans mise en place d'une plaque prothétique quelle que soit la voie d'abord - Thyroïdectomie	Pas d'ATB	Pas d'ATB	
- Chirurgie de l'intestin grêle (y compris anastomose bilio-digestive) - Chirurgie colorectale et appendiculaire* (y compris plastie colique) - Plaies de l'abdomen - <b>Rétablissement de continuité</b>	Céfoxitine + <b>Imidazolé</b>	2 g IV lente <b>1 g (perfusion)</b>	Dose unique (si durée > 2 h, réinjecter 1g) <b>Dose unique</b>
	Allergie : Imidazolé + Gentamicine	1g (perfusion) 5 mg/kg/j IVSE	Dose unique Dose unique
Chirurgie proctologique	Imidazolé	1 g (perfusion)	Dose unique
- Contamination du champ opératoire à l'ouverture	Amoxicilline-acide clavulanique + Gentamicine	2 g IV lente 5 mg/kg/j IVSE	Ré-injection de 1g/2h en peropératoire puis 1 g toutes les 6h pendant 48h Dose unique
	Allergie : Imidazolé	1g (perfusion)	500 mg/8h pendant 48h

Drs B. Szekeley et P. Lesprit le 21/12/2017

Validé en chirurgie digestive et par la COMAI et le CLIN le 22/03/2018

Service Anesthésie Pr Fischler

	+ Gentamicine	5 mg/kg/j IVSE	Dose unique
- péritonite** (y compris appendice perforé).	Amoxicilline-acide clavulanique**	2 g IV lente	Ré-injection de 1g/2h en peropératoire puis 1 g toutes les 6h
*Antibiothérapie indicative à adapter et à poursuivre en fonction des résultats bactériologiques	+ Gentamicine	5 mg/kg/j IVSE	Dose unique
	Allergie : Imidazolé + Gentamicine	1g (perfusion)  5 mg/kg/j IVSE	500 mg/8h  Dose unique

\*Appendice normal ou inflammatoire et absence d'abcès, de perforation, de gangrène...

\*\* En cas de péritonite généralisée, stercorale ou de choc septique : piperacilline-tazobactam +  
gentamicine