

ANTIBIOPROPHYLAXIE EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE

Acte chirurgical	Antibiotique DCI	Dose initiale	Ré-injection et durée
- Gastrostomie endoscopique - Sclérose de varices oesophagiennes	Amoxicilline-acide clavulanique**	2 g IV lente	Dose unique
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	900 mg IVSE 5 mg/kg	Dose unique Dose unique
- Ponction sous écho endoscopie (de kystes pancréatiques) ou trans colique	Amoxicilline-acide clavulanique** (à la demande du gastroentérologue)	2 g IV lente	Dose unique
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine (à la demande du gastroentérologue)	900 mg IVSE 5 mg/kg	Dose unique Dose unique
- Cholangio rétrograde (CPRE) - Sphinctérotomie	Céfotaxime (à la demande du gastroentérologue)	2 g IV lente	Dose unique (vérifier poursuite et durée des ATB en postopératoire)
	Allergie : Gentamicine (à la demande du gastroentérologue)	5 mg/kg	Dose unique (vérifier poursuite et durée des ATB en postopératoire)
- Coloscopie ou Fibroscopie (sans cirrhose) - Ligature de VO - Prothèse oesophagienne - Coloscopie ou Fibroscopie avec cirrhose	Pas d'ATB		
- Drainage biliaire pour obstruction cancéreuse ou bénigne, ou lithiase (prothèse biliaire par voie transhépatique)	Traitement curatif Poursuite du traitement en cours		(vérifier poursuite et durée des ATB en postopératoire)

** AUGMENTIN® : amoxicilline + acide clavulanique