

ANTIBIOPROPHYLAXIE EN RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

Acte chirurgical	Antibiotique DCI	Dose initiale	Ré-injection et durée
- Embolisation de fibrome utérin - Ponction sous échographie - Radiofréquence - Cathéter et chambre implantable - Angiographie, angioplastie - Neuroradiologie interventionnelle	Pas d'ATB		
Néphrostomie	Céfazoline	2 g IV lente	Dose unique
	Allergie : gentamicine	5 mg/kg	Dose unique
- Drainage biliaire pour obstruction cancéreuse ou bénigne, ou lithiase (prothèse biliaire par voie transhépatique)	Traitement curatif <i>Poursuite du traitement en cours</i>		
- Drainage biliaire pour ictère (sans angiocholite)	Céfotaxime	2g IV lente	Dose unique <i>(vérifier poursuite et durée des ATB en postopératoire)</i>
	Allergie : gentamicine	5 mg/kg	Dose unique <i>(vérifier poursuite et durée des ATB en postopératoire)</i>
- Pose de sonde de gastrostomie	Amoxicilline, acide clavulanique*	2 g IV lente	Dose unique
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	900 mg 5 mg/kg	Dose unique Dose unique

- Endoprothèse artérielle, stent (sauf intra-coronaire) - Pose de pace maker	Céfuroxime	1,5 g IV lente	Dose unique (si durée > 2h, réinjecter 0,75 g)
	Allergie : Vancomycine**	30 mg/kg/120 minutes	Dose unique
Vertébroplastie	Céfazoline	2 g IV lente	Dose unique (si durée > 4 h, réinjecter 1g)
	Allergie : Vancomycine**	30 mg/kg/120 minutes	Dose unique
Chimioembolisation de tumeur hépatique	Amoxicilline, acide clavulanique*	2 g IV lente	Dose unique
	Allergie : Ofloxacin + métronidazole	400 mg en perfusion 1 g (perfusion)	Dose unique Dose unique

* AUGMENTIN® : Amoxicilline, acide clavulanique